乳癌の治療法

PDQ 日本語版

下表は、[米国国立癌研究所\(NCI\)](#)の情報を[がん情報サイト Cancer Information Japan](#)が日本語に訳した [PDQ 日本語版](#)の要約です。

	DCIS	LCIS	I ~ 手術可能 IIIc 期	IIIB ~ IV と転移性
<u>外科療法</u>	乳房温存術 + 放射線療法、乳房切除術、乳房温存術	予防的両側乳房切除	乳房温存術 + 放射線療法、変型根治的乳房切除術	乳房切断術
<u>化学療法</u>		タモキシフェン	タモキシフェン、タモキシフェン + 化学療法	ホルモン療法、トラスツズマブ等
その他		経過観察		

活性を示す抗がん剤

- ・ トラスツズマブ (Herceptin)
- ・ ドキソルビシン
- ・ エピルビシン
- ・ リポソーム結合ドキソルビシン
- ・ ミトキサントロン
- ・ パクリタキセル
- ・ ドセタキセル
- ・ シクロホスファミド
- ・ カペシタビン
- ・ 5-FU
- ・ メソトレキサート
- ・ ビノレルビン
- ・ ビンブラスチン
- ・ ピンクリスチン
- ・ カルボプラチン
- ・ シスプラチン
- ・ ゲムシタビン
- ・ マイトマイシン C

広く用いられている多剤併用

- ・ CA : シクロホスファミド + ドキソルビシン
- ・ ドセタキセル + ドキソルビシン
- ・ CAF : シクロホスファミド + ドキソルビシン + 5-フルオロウラシル
- ・ CMF : シクロホスファミド + メソトレキサート + 5-フルオロウラシル
- ・ ドキソルビシン + パクリタキセル
- ・ ドセタキセル + カペシタビン

海外癌医療情報リファレンス

FDA 承認薬

- ・ Femara (Letrozole)

がん患者のあきらめない診察室

- ・ ポリグルタミン酸内包タキソール (Xyotax)

最終更新時間：2005年10月27日17時27分11秒